

**Advantage® voor honden is een anti-vlooiemiddel in spot-on vorm (druppels op de huid). Dankzij een supersnelle werking stopt Advantage® bijten van vlooiën in 3 tot 5 minuten en doodt volwassen vlooiën binnen het uur, dus voor zij eitjes kunnen leggen.**

**Dieren waarvoor het product bestemd is**

Honden

**Samenstelling**

**Advantage® 40 Voor Honden**

Actieve stof : Imidacloprid 40 mg per tube (0,4 ml van een 10% oplossing)  
Antioxidant : Gebutyleerd hydroxytolueen Ph. Eur. 0,4 mg per tube

**Advantage® 100 Voor Honden**

Actieve stof : Imidacloprid 100 mg per tube (1,0 ml van een 10% oplossing)  
Antioxidant : Gebutyleerd hydroxytolueen Ph. Eur. 1,0 mg per tube

**Advantage® 250 Voor Honden**

Actieve stof : Imidacloprid 250 mg per tube (2,5 ml van een 10% oplossing)  
Antioxidant : Gebutyleerd hydroxytolueen Ph. Eur. 2,5 mg per tube

**Advantage® 400 Voor Honden**

Actieve stof : Imidacloprid 400 mg per tube (4,0 ml van een 10% oplossing)  
Antioxidant : Gebutyleerd hydroxytolueen Ph. Eur. 4,0 mg per tube



Klik om te vergroten

**Problemen**

Klik op een probleem voor meer info:

[Vlooiën](#)

[Gebruiksaanwijzing](#)

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Aanbevelingen](#)

[Indicaties](#)

[Contra-indicaties](#)

[Ongewenste effecten](#)

[Toedieningswijze en toedieningsweg](#)

[Registratiehouder](#)

<b>Actieve stoffen</b>	
Imidacloprid	
<b>Gehalten</b>	
<b>Toxicologische groepen</b>	
Vrije aflevering	
<b>Farmaceutische vorm en verpakking</b>	
Spot-on oplossing (druppels op de huid)	
<b>Registratienummer</b>	
Reg NL 9211 (40)	
Reg NL 9212 (100)	
Reg NL 9213 (250)	
Reg NL 9558 (400)	

### • Gebruiksaanwijzing

### • Voorzorgsmaatregelen

Na gebruik de handen grondig wassen.

Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen.

Personen met bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product.

Contact van het product met de ogen of de mond vermijden.

Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water.

Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen.

Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.

Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de tube niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier.

Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Er werden geen primair embryotoxische, teratogene of reproductietoxische effecten waargenomen tijdens de studies met imidacloprid op ratten en konijnen. De studies op drachtige en melkgevende teven samen met hun nakomelingen zijn beperkt. Het bewijs tot nu

toe doet veronderstellen dat er geen neveneffecten te verwachten zijn bij deze dieren.

Er werden geen interacties waargenomen na toediening van het dubbele van de aanbevolen dosering van dit product en vaak gebruikte diergeneesmiddelen op basis van fenthion, lufenuron, milbemycine, febantel, pyrantel of praziquantel. De verenigbaarheid van het product werd ook aangetoond met een wijde groep aan routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.

### **Aanbevelingen**

### **Indicaties**

Voor de preventie en behandeling van vlooiën bij honden, gebruik het geschikte Advantage® voor honden product (zie rubriek 'Dosering').  
Op de hond aanwezige vlooiën worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen de ontwikkeling van een vlooiënpopulatie gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis.

### **Contra-indicaties**

Niet gespeende pups van minder dan 8 weken ouderdom niet behandelen.

### **Ongewenste effecten**

Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten (zie rubriek 'Toedieningswijze en toedieningsweg').

### **Toedieningswijze en toedieningsweg**

#### **Doseringsschema:**

<b>Hond (Kg/lichaamsgewicht)</b>	<b>Product</b>	<b>Aantal tubes</b>	<b>mg/kg lichaamsgewicht</b>
minder dan 4	Advantage® 40 Voor Honden	1 x 0,4 ml	minimaal 10
4 tot minder dan 10	Advantage® 100 voor honden	1 x 1,0 ml	10 - 25
10 tot minder dan 25	Advantage® 250 voor honden	1 x 2,5 ml	10 - 25
25 tot minder dan 40	Advantage® 400 voor honden	1 x 4,0 ml	maximaal 16
40 en meer	Advantage® 400 voor honden	2 x 4,0 ml	maximaal 20

Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooiën in de omgeving kan gedurende 6 weken

of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving.

Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving.

In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.

### **Wijze van toediening:**

Neem een tube uit de verpakking. Houdt de tube rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.



Bij een rechtopstaande hond de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.



Plaats de open zijde van de tube op de huid en knijp enkele malen de tube stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. Een correcte toediening minimaliseert de gelegenheid voor de hond om aan het product te likken.

Enkel aanbrengen op de onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

### **• Registratiehouder**

Bayer BV  
Energieweg 1  
NL - 3641 RT Mijdrecht  
029/ 728 04 80