

Advantage® voor katten is een anti-vlooiemiddel in spot-on vorm (druppels op de huid). Dankzij een supersnelle werking stopt Advantage® bijten van vlooiën in 3 tot 5 minuten en doodt volwassen vlooiën binnen het uur, dus voor zij eitjes kunnen leggen.

Dieren waarvoor het product bestemd is

Katten

Samenstelling

Advantage® 40 Voor Katten

Actieve stof : Imidacloprid, 40 mg per tube (0,4 ml van een 10% oplossing)
Antioxidant : Gebutyleerd hydroxytolueen Ph. Eur. 0,4 mg per tube

Advantage® 80 Voor Katten

Actieve stof : Imidacloprid, 80 mg per tube (0,8 ml van een 10% oplossing)
Antioxidant : Gebutyleerd hydroxytolueen Ph. Eur. 0,8 mg per tube

Actieve stoffen

Imidacloprid

Gehalten

Toxicologische groepen

Vrije aflevering



Klik om te vergroten

Problemen

Klik op een probleem voor meer info:

Vlooiën

- [Gebruiksaanwijzing](#)
- [Voorzorgsmaatregelen](#)
- [Aanbevelingen](#)
- [Indicaties](#)
- [Contra-indicaties](#)
- [Ongewenste effecten](#)
- [Toedieningswijze en toedieningsweg](#)
- [Registratiehouder](#)

Farmaceutische vorm en verpakking

Spot-on oplossing (druppels op de huid)

Registratienummer

Reg NL 9214 (40) en Reg NL 9215 (80)

Gebruiksaanwijzing**Voorzorgsmaatregelen**

Na gebruik de handen grondig wassen.
Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen.
Personen met bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product.
Contact van het product met de ogen of de mond vermijden.
Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water.
Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen.
Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.

Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de tube niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier.
Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Er werden geen primair embryotoxische, teratogene of reproductietoxische effecten waargenomen tijdens de studies met imidacloprid op ratten en konijnen. De studies op drachtige en melkgevende poezen samen met hun nakomelingen zijn beperkt. Het bewijs tot nu toe doet veronderstellen dat er geen neveneffecten te verwachten zijn bij deze dieren.

Er werden geen interacties waargenomen na toediening van het dubbele van de aanbevolen dosering van dit product en vaak gebruikte diergeneesmiddelen op basis van lufenuron, pyrantel of praziquantel. De verenigbaarheid van het product werd ook aangetoond met een wijde groep aan routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.

Aanbevelingen**Indicaties**

Voor de preventie en de behandeling van vlooien bij katten.
Vlooien bij katten worden gedood binnen de dag na behandeling. Een éénmalige behandeling beschermt tegen de ontwikkeling van een vlooienpopulatie gedurende 3 tot 4 weken. Het product kan gebruikt als onderdeel van de bestrijdingsstrategie tegen vlooien allergie

dermatitis.

• **Contra-indicaties**

Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken ouderdom niet behandelen.

• **Ongewenste effecten**

Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten (zie rubriek 'Toedieningswijze en toedieningsweg').

• **Toedieningswijze en toedieningsweg**

Doseringschema:

Kat (kg lichaamsgewicht)	Product	Aantal tubes	mg/kg lichaamsgewicht
minder dan 4	Advantage® 40 voor katten	1 x 0,4 ml	minimaal 10
4 en meer	Advantage® 80 voor katten	1 x 0,8 ml	maximaal 20


Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooiën in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooiën in de omgeving.

Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooiën in de omgeving.

In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.

Wijze van toediening:

Neem een tube uit de verpakking. Houdt de tube rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.



Druk de haren op de nek van de kat ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt.



Plaats de open zijde van de tube op de huid en knijp enkele malen de tube stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. De toediening aan de schedelbasis minimaliseert de gelegenheid voor de kat om aan het product te likken.

Enkel aanbrengen op de onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Registratiehouder

Bayer BV
Energieweg 1
NL - 3641 RT Mijdrecht
029/ 728 04 80