



Home

Alfabetisch overzicht

Endoparasieten bij dieren

Ectoparasieten op dieren

Ectoparasieten in de omgeving

Voedingssupplement

Bayer Links

Bayer Global

Bayer in België

Bayer AnimalHealth

Alg. gebruiksvoorwaarden

Privacy verklaring

Imprint

Producten

Problemen

Veel gestelde vragen

Advantix®

Voor de bestrijding en de preventie van een vlooienbesmetting (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) en teken.

Dieren waarvoor het product bestemd is

Honden

Samenstelling

Imidacloprid-Permethrine-
Butylhydroxytolueen (E321)
N-methylpyrrolidone-Miglyol 812-
Citroenzuur (E330)

Actieve stoffen

Imidacloprid: 100 mg/ml
Permethrine: 500 mg/ml

Gehalten

Toxicologische groepen

Antiparasitair middel

Farmaceutische vorm en verpakking

Spot-on oplossing.

Heldere, gele tot bruine oplossing.

Registratienummer

BE-V261012 (Advantix 40/200)
BE-V261021 (Advantix 100/500)
BE-V261037 (Advantix 250/1250)
BE-V261046 (Advantix 400/2000)



Klik om te vergroten

Problemen

Klik op een probleem voor meer info:


- **Vlooien**
- **Teken**

- **Gebruiksaanwijzing**
- **Voorzorgsmaatregelen**
- **Aanbevelingen**
- **Indicaties**
- **Contra-indicaties**
- **Ongewenste effecten**
- **Toedieningswijze en toedieningsweg**
- **Registratiehouder**

● **Gebruiksaanwijzing**

Enkel voor gebruik op de huid. Enkel aanbrengen op onbeschadigde huid.

Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.



Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de behandeling. Een éénmalige behandeling voorkomt verdere vlooienbesmetting gedurende vier weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

● **Voorzorgsmaatregelen**

Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of muil van de te behandelen honden.

Men dient erop toe te zien dat het product correct wordt toegediend, zoals beschreven in rubriek 4.9. In het bijzonder dient orale opname door het likken aan de toedieningsplaats door behandelde honden of door dieren die in ermee in contact komen, vermeden te worden.

Niet gebruiken bij katten.



Dit product is extreem giftig voor katten en zou fataal kunnen zijn vanwege de specifieke fysiologie van katten, die sommige verbindingen zoals permethrine niet kan afbreken. Houd behandelde honden verwijderd van katten totdat de toedieningsplaats droog is, om te voorkomen dat katten per ongeluk worden blootgesteld aan dit product. Het is belangrijk te verzekeren dat katten niet likken aan de toedieningsplaats van een hond die met dit product werd behandeld. Zoek onmiddellijk diergeneeskundig advies indien dit gebeurt.

Raadpleeg uw dierenarts vooraleer het product te gebruiken bij zieke en verzwakte honden.

Behandelde honden mogen onder geen enkele omstandigheid toegelaten worden tot om het even welke vorm van oppervlaktewater gedurende tenminste 48 uur na behandeling, omdat het product schadelijk is voor aquatische organismen.

• Aanbevelingen

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Uitsluitend aanbrengen op onbeschadigde huid.
Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.

Het oplosmiddel in Advantix® spot-on oplossing zou verschillende materialen kunnen bevleken waaronder leder, stof, kunststof en delicate oppervlakken. Laat de toedieningsplaats drogen voordat contact met dergelijke oppervlakken wordt toegelaten.

• Indicaties

Voor de bestrijding en de preventie van een vlooiënbesmetting (*C. canis*, *C. felis*).

Op de hond aanwezige vlooiën worden gedood binnen één dag na de behandeling. Een éénmalige behandeling voorkomt verdere vlooiënbesmetting gedurende vier weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis (VAD).

Het product heeft een persisterende acaricide en afwerende doeltreffendheid tegen besmettingen door teken (*R. sanguineus* en *I. ricinus* gedurende vier weken en *D. reticulatus* gedurende drie weken).

Het kan gebeuren dat teken die al op de hond zaten binnen twee dagen na behandeling niet gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken, die al op de hond zitten op het ogenblik van de behandeling, te verwijderen om hen zo te beletten zich vast te hechten en een bloedmaaltijd te nemen.

Eén behandeling biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen zandvliegen (*P. papatasi* gedurende twee weken en *P. perniciosus* gedurende drie weken), tegen muggen (*A. aegypti* gedurende twee weken en *C. pipiens* gedurende vier weken) en tegen stalvliegen (*S. calcitrans*) gedurende vier weken.

• Contra-indicaties

In afwezigheid van beschikbare gegevens zou het product niet mogen gebruikt worden bij pups van minder dan 7 weken of 1,5 kg lichaamsgewicht.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij katten

• Ongewenste effecten

In zeer zeldzame gevallen kunnen bij de hond reacties optreden zoals voorbijgaande huid-overgevoeligheid (toename van lokale jeuk, krabben, wrijven, haarverlies en roodheid op de toedieningsplaats) of lusteloosheid, die doorgaans vanzelf verdwijnen.

In zeer zeldzame gevallen kunnen honden gedragsveranderingen (agitatie, rusteloosheid, gejack of gerol), gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, hypersalivatie, verminderde eetlust) en neurologische verschijnselen vertonen, zoals onregelmatige bewegingen en stuip trekkingen bij honden die gevoelig zijn voor het bestanddeel permethrine. Deze verschijnselen zijn over het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen doorgaans vanzelf.

Vergiftiging door ongewilde orale opname door honden is onwaarschijnlijk, maar zou in zeer zeldzame gevallen kunnen voorkomen. In dit geval kunnen zenuwverschijnselen zoals trillen en lusteloosheid optreden. De behandeling zou symptomatisch moeten zijn. Er is geen specifiek tegengif bekend.

• Toedieningswijze en toedieningsweg

De aanbevolen minimale dosis is:
10 mg/kg lichaamsgewicht (LG) imidacloprid en 50 mg/kg lichaamsgewicht (LG) permethrine.

Doseringsschema voor Advantix spot-on:

Honden (kg lichaamsgewicht)	Merknaam	Volume (ml)	Imidacloprid (mg/kg lichaamsgewicht)	Permethrine (mg/kg lichaamsgewicht)
4 kg	Advantix 40/200 spot-on solution voor honden	0,4 ml	minimaal 10	minimaal 50
> 4 10 kg	Advantix 100/500 spot-on solution voor honden	1,0 ml	10 - 25	50 - 125
> 10 25 kg	Advantix 250/1250 spot-on solution voor honden	2,5 ml	10 - 25	50 - 125
> 25 40 kg	Advantix 400/2000 spot-on solution voor honden	4,0 ml	10 - 16	50 - 80

Voor honden > 40 kg dient de geschikte combinatie van pipetten gebruikt te worden.

• **Registratiehouder**



Bayer SA-NV
Louizalaan 143
B-1050 Brussel