

Cystease®

Beschermt de blaaswand

Cystease

Cystease bevat N-Acetyl-D-Glucosamine, en is een van de weinige hulpmiddelen die ingezet kan worden bij de idiopathische blaasontstekingen. Cystease helpt de beschadigde blaaswand te herstellen en gezond te houden.

- verbetert en beschermt de blaaswand direct
- smakelijke tabletten, eenvoudig in te geven
- kan gecombineerd worden met Feliway® tegen stress



Cystease®

Smakelijke tabletten

Cystease® wordt geleverd in een verpakking van 3 blisters van 30 tabletten. Ze kunnen dagelijks ingegeven, of eventueel door het voer worden gemengd.



Cystease®

Cystease®

*Blaasontsteking bij de kat
Wat is er tegen te doen?*



CEVA SANTE ANIMALE

Naaldwijk, NL. Tel. 0174-643930, Fax 0174-643924,
E-mail: cevanl@ceva.com, Internet: www.ceva.nl



Blaasontsteking bij de kat

Blaas- en urinewegontsteking komen veel voor bij de kat.

Hij of zij moet vaker op de bak, mauwt van ongemak en is soms zelfs onzindelijk.

Deze verschijnselen worden met name veroorzaakt door de beschadigingen aan de blaaswand door de infectie. Deze beschadigingen zijn zeer pijnlijk voor de kat. In een groot aantal van deze gevallen is er, behalve stress, geen duidelijke oorzaak te vinden.

Wat zijn de verschijnselen?

Katten met blaas- en urinewegontsteking vertonen veelal een of meerdere van de volgende verschijnselen:

- pijn bij het plassen
- moeite met plassen, persen
- (veel) plassen
- bloed bij de urine
- onzindelijkheid
- gedragswijzigingen (agressie).



Wat is er tegen te doen?

Wat is de oorzaak?

Blaas- en urinewegontsteking kan op alle leeftijden bij alle soorten dieren voorkomen.

Het komt echter meer voor bij katten die:

- droogvoer krijgen
- van middelbare leeftijd zijn
- last hebben van overgewicht/ te weinig beweging krijgen
- beperkt buiten komen en alleen binnen op de kattenbak gaan
- gesteriliseerde poezen/gecastreerde katers (deze laatste zijn vaker verstopt)

In de meeste gevallen is er geen echte oorzaak te vinden. Dit zijn de zogenaamde idiopathische blaasontstekingen. Nieuw onderzoek geeft echter duidelijk de rol van stress bij deze aandoeningen aan. Bekende stressfactoren zijn opeens ander voer krijgen, veranderingen in de omgeving, weersverandering, te veel andere katten, stress van de eigenaar, en de introductie van een nieuw huisdier.

Wat kunt u doen?

1) Verminder de stress

Stress is een van de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan of oplaaien van blaas- en urinewegontsteking; zorg ervoor dat stress-oorzaken worden weggenomen en gebruik Feliway® om de kat gerust te stellen.

2) Geef blikvoer en veel water

Meng zonodig extra water door het blikvoer.

3) Cystease

Cystease bindt op de defecte blaaswand en urinewegen en vermindert zo de ontsteking en stimuleert de gezonde blaasfunctie.

Het helpt de beschadigde blaaswand te herstellen en gezond te houden.

4) Eventueel aanvullende medicatie.

Stimuleert gezonde blaasfunctie

Het beste resultaat wordt verkregen door de hiervoor staande adviezen tegelijkertijd in te voeren. Dus de stress verminderen, Cystease® geven om de blaaswand te herstellen en een vochtig dieet verstrekken. Zonodig kan uw dierenarts daarnaast aanvullende medicijnen geven. In de meerderheid van de gevallen zal een aan de kat aangepaste behandeling de klinische verschijnselen doen afnemen en verdere verschijnselen voorkomen.

