



# Stronghold® Pup / kitten

## FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing voor toepassing op de huid.

## SAMENSTELLING

Per ml 60 mg selamectine.

## EIGENSCHAPPEN

Topicaal endo- en ectoparasiticum.

## DOELDIEREN

Pups en kittens tot 2,5 kg.

## INDICATIES

### Pups en kittens:

- Behandeling en preventie van besmettingen door vlooien veroorzaakt door *Ctenocephalides* spp. gedurende 1 maand volgend op een enkele behandeling, als resultaat van de adulticide en larvicide eigenschappen van het product. Het product is tevens ovicide voor een periode van drie weken na toediening. Gebruik als deel van de behandelingsstrategie bij dermatitis veroorzaakt door allergie voor vlooien
- Preventie van hartwormziekte veroorzaakt door *Dirofilaria immitis*, maandelijks toegediend
- Behandeling van infecties met volwassen intestinale spoelwormen (*Toxocara canis* bij de hond en *Toxocara cati* bij de kat)
- Behandeling van infecties met bijtende luizen (*Trichodectes canis* bij de hond en *Felicola subrostratus* bij de kat)

### Pups:

- Behandeling van schurftmijt (veroorzaakt door *Sarcoptes scabiei*)
- Behandeling van oormijt (*Otodectes cynotis*)

### Kittens:

- Behandeling van oormijt (*Otodectes cynotis*)
- Behandeling van infecties met volwassen intestinale haakwormen (*Ancylostoma tubaeforme*)

## TOEDIENING/DOSERING

Breng de inhoud van een tube aan direct op de huid aan de basis van de nek, voor de schouderbladen.

- **Behandeling en preventie van vlooienbesmettingen:** na toediening worden volwassen vlooien gedood en worden geen levensvatbare vlooieneieren meer geproduceerd; dit stopt de voortplanting en maakt een einde aan de levenscyclus van de vlo. Om blijvende preventie van vlooienbesmettingen te garanderen moet het product tijdens het vlooienseizoen iedere maand worden toegediend, te beginnen 1 maand voordat de vlooien actief gaan worden. Door middel van een reductie van de vlooienspopulatie draagt maandelijkse behandeling van drachtige en lacterende dieren bij aan de preventie van vlooienbesmettingen bij zogende pups en kittens uit het nest tot een leeftijd van 7 weken. Voor gebruik als deel van de behandelingsstrategie bij vlooiensallergie dient het product het gehele jaar door met maandelijkse intervallen te worden gegeven
- **Preventie van hartwormziekte:** in gebieden waar hartworm endemisch is dient het product het gehele jaar door met maandelijkse intervallen te worden gegeven, of tenminste binnen een maand nadat het dier voor het eerst aan muggen is blootgesteld tot en met een maand nadat het dier voor het laatst aan muggen is blootgesteld. In verband met GVP dient in hartwormgebieden voor start van de behandeling gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van volwassen *Dirofilaria*. Het product is wel volledig veilig bij gebruik in hartworm positieve dieren
- **Behandeling van oormijt:** een enkele dosis toedienen. Bij honden dient na 30 dagen controle plaats te vinden omdat in incidentele gevallen een tweede behandeling noodzakelijk is. Reiniging van de gehoorgang voorafgaande aan de behandeling wordt aanbevolen.
- **Behandeling van schurftmijt:** voor een volledige eliminatie van alle mijten dient het product twee maal te worden toegediend met een maand interval
- **Behandeling van bijtende luizen:** een enkele dosis is voldoende voor het elimineren van de besmetting
- **Behandeling van spoel- en haakworminfecties bij dieren ouder dan 6 weken:** een enkele dosis is voldoende om de aanwezige volwassen wormen te doden



# Stronghold® Pup / kitten



## CONTRA-INDICATIES

---

Niet toedienen aan dieren jonger dan 6 weken.

Niet gebruiken bij zieke katten of verzwakte katten met een naar leeftijd en grootte te laag gewicht.

## BIJWERKINGEN

---

Op de plaats van toediening kan licht en tijdelijk haarverlies optreden, incidenteel gepaard gaande met voorbijgaande plaatselijke irritatie. In zeldzame gevallen kan op de plaats van toediening een tijdelijke lokale klontering van haar optreden en/of het verschijnen van een kleine hoeveelheid wit poeder. Dit heeft geen invloed op veiligheid of werkzaamheid van het product.

## WAARSCHUWINGEN

---

Niet oraal, parenteraal of in de gehoorgang toedienen. Niet aanbrengen als de vacht nat is. Vermijd contact met behandelde dieren tot 30 minuten na de toediening. Behandelde dieren niet wassen of in het water laten tot 2 uur na de applicatie. Tijdens het gebruik van het product contact met hitte, vonken, open vuur of andere vormen van ontsteking vermijden.

## BEWAARCONDITIES/HOUDBAARHEID

---

Niet bewaren boven 30°C. Bewaren in ongeopende folieverpakking op een droge plaats.

## VERPAKKING

---

Doos met drie tubes van 0,25 ml (bevattende 15 mg werkzame stof)

## REGISTRATIENUMMER/KANALISATIE-STATUS

---

REG NL 9813 UDA

EU 2/99/014/001 UDA

8/2001



# Stronghold® Kat

## FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing voor toepassing op de huid

## SAMENSTELLING

Per ml 60 mg selamectine.

## EIGENSCHAPPEN

Topicaal endo- en ectoparasiticum.

## DOELDIER

Katten van 2,6 tot 7,5 kg.

## INDICATIES

- Behandeling en preventie van besmettingen door vlooien veroorzaakt door *Ctenocephalides* spp. gedurende 1 maand volgend op een enkele behandeling, als resultaat van de adulticide en larvicide eigenschappen van het product. Het product is tevens ovicide voor een periode van drie weken na toediening. Gebruik als deel van de behandelingsstrategie bij dermatitis veroorzaakt door allergie voor vlooien
- Preventie van hartwormziekte veroorzaakt door *Dirofilaria immitis*, maandelijks toegediend
- Behandeling van infecties met volwassen intestinale spoolwormen (*Toxocara cati*)
- Behandeling van infecties met volwassen intestinale haakwormen (*Ancylostoma tubaeforme*)
- Behandeling van oormijt (*Otodectes cynotis*)
- Behandeling van infecties met bijtende luizen (*Felicola subrostratus*)

## TOEDIENING/DOSERING

Breng de inhoud van een tube aan direct op de huid aan de basis van de nek, voor de schouderbladen.

- **Behandeling en preventie van vlooienbesmettingen:** Na toediening worden volwassen vlooien gedood en worden geen levensvatbare vlooieneieren meer geproduceerd; dit stopt de voortplanting en maakt een einde aan de levenscyclus van de vlo. Om blijvende preventie van vlooienbesmettingen te garanderen moet het product tijdens het vlooienseizoen iedere maand worden toegediend, te beginnen 1 maand voordat de vlooien actief gaan worden. Door middel van een reductie van de vlooienuitvoering draagt maandelijks behandeling van drachtige en lacterende dieren bij aan de preventie van vlooienbesmettingen bij zogende kittens uit het nest tot een leeftijd van 7 weken. Voor gebruik als deel van de behandelingsstrategie bij vlooiensensibilisatie dient het product het gehele jaar door met maandelijks intervallen te worden gegeven
- **Preventie van hartwormziekte:** In gebieden waar hartworm endemisch is dient het product het gehele jaar door met maandelijks intervallen te worden gegeven, of tenminste binnen een maand nadat het dier voor het eerst aan muggen is blootgesteld tot en met een maand nadat het dier voor het laatst aan muggen is blootgesteld. In verband met GVP dient in hartwormgebieden voor start van de behandeling gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van volwassen *Dirofilaria*. Het product is wel volledig veilig bij gebruik in hartworm positieve dieren
- **Behandeling van spool- en haakworminfecties:** Een enkele dosis is voldoende om de aanwezige volwassen wormen te doden
- **Behandeling van oormijt:** Een enkele dosis is voldoende voor het doden van de aanwezige mijten
- **Behandeling van bijtende luizen:** Een enkele dosis is voldoende voor het elimineren van de besmetting

## CONTRA-INDICATIES

Niet toedienen aan dieren jonger dan 6 weken. Niet gebruiken bij zieke katten of verzwakte katten met een naar leeftijd en grootte te laag gewicht.

## BIJWERKINGEN

Op de plaats van toediening kan licht en tijdelijk haarverlies optreden, incidenteel gepaard gaande met voorbijgaande plaatselijke irritatie. In zeldzame gevallen kan op de plaats van toediening een tijdelijke lokale klontering van haar optreden en/of het verschijnen van een kleine hoeveelheid wit poeder. Dit heeft geen invloed op veiligheid of werkzaamheid van het product.

## WAARSCHUWINGEN

Niet oraal, parenteraal of in de gehoorgang toedienen. Niet aanbrengen als de vacht nat is. Vermijd contact met behandelde dieren tot 30 minuten na de toediening. Behandelde dieren niet wassen of in het water laten tot 2 uur na de applicatie. Tijdens het gebruik van het product contact met hitte, vonken, open vuur of andere vormen van ontsteking vermijden.

## BEWAARCONDITIES/HOUDBAARHEID

Niet bewaren boven 30°C. Bewaren in ongeopende folieverpakking op een droge plaats.

## VERPAKKING

Doos met drie tubes van 0,75 ml (bevattende 45 mg werkzame stof).

## REGISTRATIENUMMER/KANALISATIE-STATUS

REG NL 9813 UDA

EU 2/99/014/002 UDA





# Stronghold<sup>®</sup> Hond

## FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing voor toepassing op de huid.

## SAMENSTELLING

Per ml. 120 mg selamectine.

## EIGENSCHAPPEN

Topicaal endo- en ectoparasiticum.

## DOELDIEREN

Honden van 2,6 tot 5 kg (Stronghold "lila")

Honden van 5,1 tot 10 kg (Stronghold "bruin")

Honden van 10,1 tot 20 kg (Stronghold "rood")

Honden van 20,1 tot 40 kg (Stronghold "groen")

## INDICATIES

- Behandeling en preventie van besmettingen door vlooien veroorzaakt door *Ctenocephalides* spp. gedurende 1 maand volgend op een enkele behandeling, als resultaat van de adulticide en larvicide eigenschappen van het product. Het product is tevens ovicide voor een periode van drie weken na toediening. Gebruik als deel van de behandlungsstrategie bij dermatitis veroorzaakt door allergie voor vlooien
- Preventie van hartwormziekte veroorzaakt door *Dirofilaria immitis*, maandelijks toegediend
- Behandeling van infecties met volwassen intestinale spoolwormen (*Toxocara canis*)
- Behandeling van schurftmijt (veroorzaakt door *Sarcoptes scabiei*)
- Behandeling van infecties met bijtende luizen (*Trichodectes canis*)
- Behandeling van oormijt (*Otodectes cynotis*)

## TOEDIENING/DOSERING

Breng de inhoud van een tube aan direct op de huid aan de basis van de nek, voor de schouderbladen.

- **Behandeling en preventie van vlooienbesmettingen:** na toediening worden volwassen vlooien gedood en worden geen levensvatbare vlooieneieren meer geproduceerd; dit stopt de voortplanting en maakt een einde aan de levenscyclus van de vlo. Om blijvende preventie van vlooienbesmettingen te garanderen moet het product tijdens het vlooienseizoen iedere maand worden toegediend, te beginnen 1 maand voordat de vlooien actief gaan worden. Door middel van een reductie van de vlooienspopulatie draagt maandelijkse behandeling van drachtige en lacterende dieren bij aan de preventie van vlooienbesmettingen bij zogende pups uit het nest tot een leeftijd van 7 weken. Voor gebruik als deel van de behandlungsstrategie bij vlooiensallergie dient het product het gehele jaar door met maandelijkse intervallen te worden gegeven
- **Preventie van hartwormziekte:** in gebieden waar hartworm endemisch is dient het product het gehele jaar door met maandelijkse intervallen te worden gegeven, of tenminste binnen een maand nadat het dier voor het eerst aan muggen is blootgesteld tot en met een maand nadat het dier voor het laatst aan muggen is blootgesteld. In verband met GVP dient in hartwormgebieden voor start van de behandeling gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van volwassen *Dirofilaria*. Het product is wel volledig veilig bij gebruik in hartworm positieve dieren
- **Behandeling van spoolworminfecties bij dieren ouder dan 6 weken:** een enkele dosis is voldoende om de aanwezige volwassen wormen te doden
- **Behandeling van schurftmijt:** voor een volledige eliminatie van alle mijten dient het product twee maal te worden toegediend met een maand interval
- **Behandeling van bijtende luizen:** een enkele dosis is voldoende voor het elimineren van de besmetting
- **Behandeling van oormijt:** een enkele dosis toedienen. Bij honden dient na 30 dagen controle plaats te vinden omdat in incidentele gevallen een tweede behandeling noodzakelijk is. Reiniging van de gehoorgang voorafgaande aan de behandeling wordt aanbevolen.

## CONTRA-INDICATIES

Niet toedienen aan dieren jonger dan 6 weken.



# Stronghold<sup>®</sup> Hond



## BIJWERKINGEN

---

Op de plaats van toediening kan licht en tijdelijk haarverlies optreden, incidenteel gepaard gaande met voorbijgaande plaatselijke irritatie. In zeldzame gevallen kan op de plaats van toediening een tijdelijke lokale klontering van haar optreden en/of het verschijnen van een kleine hoeveelheid wit poeder. Dit heeft geen invloed op veiligheid of werkzaamheid van het product.

## WAARSCHUWINGEN

---

Niet oraal, parenteraal of in de gehoorgang toedienen. Niet aanbrengen als de vacht nat is. Vermijd contact met behandelde dieren tot 30 minuten na de toediening. Behandelde dieren niet wassen of in het water laten tot 2 uur na de applicatie. Tijdens het gebruik van het product contact met hitte, vonken, open vuur of andere vormen van ontsteking vermijden.

## BEWAARCONDITIES/HOUDBAARHEID

---

Niet bewaren boven 30°C. Bewaren in ongeopende folieverpakking op een droge plaats.

## VERPAKKING

---

Lila: Doos met drie tubes van 0,25 ml (bevattende 30 mg. werkzame stof)

Bruin: Doos met drie tubes van 0,50 ml (bevattende 60 mg. werkzame stof)

Rood: Doos met drie tubes van 1,0 ml (bevattende 120 mg. werkzame stof)

Bruin: Doos met drie tubes van 2,0 ml (bevattende 240 mg. werkzame stof)

## REGISTRATIENUMMER/KANALISATIE-STATUS

---

REG NL 9814 UDA

EU 2/99/014/003 t/m 006 UDA

8/2001